

**Escala de avaliação funcional da mielopatia cervical espondilótica  
“modificada” da Associação Japonesa de Ortopedia  
(Tradução do Inglês - Não validada)**

**Escore de disfunção motora das extremidades superiores**

0	Incapacidade de mover as mãos
1	Incapacidade de comer com colher, mas capaz de mover as mãos.
2	Incapaz de abotoar a camisa, mas capaz de comer com colher.
3	Capaz de abotoar a camisa com grande dificuldade
4	Capaz de abotoar a camisa com leve dificuldade
5	Sem disfunção

**Escore de disfunção motora das extremidades inferiores**

0	Completa perda da função motora e sensitiva dos membros inferiores
1	Preservação sensitiva sem capacidade de mover as pernas
2	Capaz de mover as pernas, mas incapaz de andar.
3	Capaz de deambular no plano com bengala ou moleta
4	Capaz de subir e descer escadas com auxílio de corrimão
5	Capaz de subir e descer escadas sem auxílio de corrimão, mas com moderada a significativa falta de estabilidade.
6	Leve falta de estabilidade, mas caminha sem auxílio.
7	Sem alteração da função

**Escore de disfunção sensitiva dos membros superiores**

0	Completa perda sensitiva nas mãos
1	Perda sensitiva grave ou dor
2	Leve perda sensitiva
3	Sem perda sensitiva

**Escore de disfunção dos esfíncteres**

0	Incapaz para micção espontânea
1	Marcada dificuldade para micção
2	Leve a moderada dificuldade para micção
3	Micção normal

Baseada em” Naderi S. and cols.“

(<http://www.aans.org/education/journal/neurosurgical/dec96/1-6-5.asp>).